



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



FREDON Poitou-Charentes

S.R.A.L. POITOU - CHARENTES

Bulletin technique n° 03 du 11 Mars 2009 (1 page)

sic n°4

Grandes Cultures

COLZA : Stade C2 à D1

Le stade D2 sera atteint rapidement en situations précoces.

Charançons de la tige

Les captures ont été très **faibles** depuis une semaine ; les conditions climatiques ont également été défavorables à l'activité de ces ravageurs, à l'évolution de leur maturation sexuelle et aux pontes.

Par contre, les charançons de la tige devraient bénéficier de conditions favorables ces prochains jours.

En situations non protégées vis-à-vis de ces ravageurs, intervenir ces prochains jours en profitant des conditions climatiques favorables annoncées (périodes ensoleillées, températures en hausse...).

Meligèthes

Peu de captures ont été notées récemment ; sur les plantes ayant atteint le stade de sensibilité (D1), leur activité a été pratiquement nulle.

Les cultures sont actuellement (ou seront très prochainement) protégées par l'intervention visant les charançons de la tige.

A surveiller.

Ultérieurement, une intervention spécifique meligèthes **éventuelle** devra être raisonnée au niveau de la parcelle à partir de l'évaluation de l'activité de ces ravageurs (comptage sur au moins 25 pieds choisis au hasard à l'intérieur du champ).

Aux stades D1 et D2, la protection est nécessaire pour des infestations dépassant **2 meligèthes par pied**, pour une culture en bonne état. Un seuil plus faible est à retenir pour des colzas affaiblis.

La résistance aux pyréthrinoides étant présente de façon hétérogène dans la région, on s'orientera vers les produits à base de bifenthrine ou de tau-fluvalinate non concernés par ces niveaux de résistance (ces matières actives sont cependant moins efficaces que d'autres pyréthrinoides sur des populations sensibles).

POIS

Notamment en Charente-Maritime, les semis de début février sont au stade levée.

BLE : Stade tallage

Modèle Piétin-verse

- Pour les levées précoces (octobre et 1^{ère} semaine de novembre), une seule contamination secondaire supplémentaire a été enregistrée depuis un mois en raison de la rareté des pluies.

Le risque climatique se situe au même niveau qu'en 2008, c'est à dire **modéré**.

- Pour les levées plus tardives, le risque climatique reste faible à très faible.

COLZA

Charançons de la tige

Terminer la protection

BLE

Modèle Piétin

Risque modéré pour levées précoces